

《上部消化管X線検査を受診される方へ》

※お食事制限につきましては、受診上の注意（別紙）にてご確認ください。

＜検査当日の内服について＞

- ・ 糖尿病の方・・・・・・・・受診前は、薬の服用やインスリン注射はしないでください。
(低血糖になる危険があります)
- ・ 心臓病・高血圧の方・・・薬は検査開始2時間前に200ml以内の水で必ず飲んできてください。

※ それ以外の薬は検査後にお飲みください。

薬の服用等について不安のある方は、かかりつけ医などにお問い合わせください。

＜下記の方は検査を受けられません＞

- ① 妊娠中および妊娠していると思われる方
- ② バリウム製剤に対し、過敏症（じんましん、息苦しさ、手足が冷たくなるなど）の既往歴がある方
- ③ 過去2ヶ月以内に大腸ポリープを切除された方
- ④ 過去1年以内に開腹手術や整形外科の手術をされた方
- ⑤ 腸閉塞・腸捻転の既往がある方
- ⑥ 腎臓病（人工透析）などで水分制限を受けている方
- ⑦ 過去1年以内に心筋梗塞や脳梗塞などの疾患を発症したことのある方
- ⑧ バリウムのコップをご自分で持ってお飲みになれない方
- ⑨ 自力で立位を保持することや、撮影台の手すりを自分でつかむことが困難な方
- ⑩ 体重が130kg以上の方（撮影装置の安全構造上、撮影できない場合があります）

＜検査後の注意＞

- ・ バリウム使用後の重篤な副作用としてアレルギー症状の出現がありますので、下記症状が発現しましたら、すぐに医療関係者に連絡し適切な処置を受けてください。
症状　じんましん　顔色が青白くなる　手足が冷たくなる　のどがつまる
息苦しい　息がしにくい　など
- ・ バリウム便が普通の便に戻るまでアルコール類の摂取はお控えください。
- ・ 便秘の強い方、以前バリウムを飲んで検査後なかなか排便が無くて困った方などには、下剤を多めに差し上げますのでお申し出ください。